

NUTRIPIC®

Potente regulador
digestivo en premezcla
mineral

Evita y ayuda
a tratar los
procesos
digestivos



**¡INVERTIR PARA
OBTENER RETORNO!**

*Minimiza los costes de
producción optimizando
el rendimiento productivo
y costes de producción.*

Con la garantía de:

PREBIOTEC
Lo natural al servicio de la nutrición

NUTRIPIC®

Potente regulador digestivo en premezcla mineral

Potente
normalizador
digestivo

Evita y ayuda a tratar
los procesos
digestivos

Los ingredientes de **NUTRIPIC®**, científicamente comprobados, actúan controlando los procesos digestivos más habituales del lechón, tanto destetado como en fases de entrada a cebo y precebo.

SUS PROPIEDADES MÁS IMPORTANTES SON:

- Normaliza todos los procesos digestivos.
- Evita la aparición de diarreas inespecíficas o blandeos y controla los procesos producidos por E.coli, ileítis, disentería, salmonela,...
- Sustituye parcial o totalmente al Óxido de Zinc.
- Potente "desmedicalizador".
- Actúa como promotor de crecimiento mejorando el índice de conversión e incrementando la velocidad de crecimiento.
- "Anti-salmonela" en últimas fases de cebo.

COMPOSICIÓN

A base de ácidos orgánicos que normalizan el funcionamiento digestivo regulando el balance electrolítico y, por tanto, el equilibrio hídrico del lechón.

Aporte de Hierro y Cobre en forma de sulfato en proporciones idóneas para el lechón.

Aporte adecuado de aceites esenciales y minerales que previenen la posible disbiosis por proliferación de flora patógena.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado en base a ingredientes naturales cuyas características principales son las siguientes:

- Capaz de normalizar los desórdenes digestivos del lechón destetado.
- Sustituye total o parcialmente al Zinc actuando como promotor de crecimiento. Reduce una semana los días a sacrificio.
- Evita en general las diarreas inespecíficas actuando, por su composición, como astringente.
- Reduce de manera significativa la incorporación de antibióticos controlando la aparición de diarreas por E.Coli, Colis enterotoxigénicos, salmonelosis, disentería e ileítis en sus distintas presentaciones.
- Su uso al final del engorde disminuye la presencia de salmonela en heces, disminuyendo de forma manifiesta el porcentaje de animales positivos.

INSTRUCCIONES DE USO

Administrar en pienso a razón de:

- 5 Kg/tn en lechones de transición
- 3 Kg/tn en precebo
- 3 Kg/tn en acabado (para evitar la presencia de salmonela en heces)

PRESENTACIÓN

